



Instructions de recueil des expectorations pour recherche de mycobactéries

✓ **Protocol de recueil :**

1. Le matin au réveil, rincer la bouche avec de l'eau du robinet ou à l'eau physiologique stérile.
2. Recueillir l'expectoration générée au cours d'un effort de toux ou après séance de kinésithérapie dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.
3. Il est important que les sécrétions recueillies soient d'origine pulmonaire et qu'elles ne contiennent pas de salive (ou le moins possible).
4. Fermer soigneusement le flacon.

✓ **Conservation/ transport :**

- 2h maximum à température ambiante, 24h entre 2-8°C (au réfrigérateur).
- Répéter le prélèvement (idem ci-dessus) 3 jours de suite.

تعليمات جمع البلغم للبحث عن المتفطرات

✓ طريقة الجمع

- في الصباح بعد الاستيقاظ، اشطف فمك بماء الصنبور أو الماء الفسيولوجي المعقم.
- قم بجمع البلغم الناتج عن السعال أو بعد جلسة العلاج الطبيعي في الوعاء المعقم الذي يوفره المختبر.
- من المهم أن تكون الإفرازات التي يتم جمعها مفرزة من الوطين وأنها لا تحتوي على لعاب (أو أقل ما يمكن).
- أغلق الوعاء بعناية.

✓ التخزين والنقل

- ساعتان كحد أقصى في درجة حرارة الغرفة، 24 ساعة بين 2-8 درجة مئوية (في الثلجة).
- كرر أخذ العينات (الموضح أعلاه) 3 أيام متتالية.