

Réalisation d'un scotch test anal ou test de GRAHAM

✓ Intérêt

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants, et parfois chez l'adulte, et très contagieux, entraînant des démangeaisons anales et des troubles du sommeil.

✓ Protocol du prélèvement :

A effectuer le matin au lever avant la toilette et avant les premières selles.

- Décoller le scotch de son support.
- Appliquer le côté adhésif sur la marge anale dépliée et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur le support (lame porte objet) fourni par le laboratoire.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Replacer les 2 lames dans le dispositif de transport.
- Identifier l'étui avec votre nom et prénom, si cela n'a pas été fait par le laboratoire, et l'acheminer au laboratoire dans les plus brefs délais.



كيفية إجراء اختبار الشريط اللاصق أو اختبار جراهام

✓ أهمية الكشف

يمكن هذا الاختبار من شخيص داء المعوية وذلك عن طريق العثور على بيض الديدان الدبوسية (ديدان طفيلية معوية)، وهو مرض طفيلي شائع جدًا عند الأطفال، وأحيانًا عند البالغين، شديد العدوى، يسبب الحكّة الشرجية واضطرابات في النوم.

✓ كيفية أخذ العينة

بعد الاستيقاظ صباحًا من النوم وقبل الغسل والتغوط يتم إجراء الخطوات التالية:

- انزع الشريط اللاصق عن الحامل.
- ضع الجانب اللاصق على هامش الشرج المكشوف وحافظ عليه بالضغط عليه لبضع ثوان.
- قم بإزالة الشريط اللاصق وانشره على الدعامة (الشريحة) التي يوفرها المختبر.
- كرر العملية مرة ثانية بشريط آخر.
- اكتب الاسم الكامل للمريض إذا لم يتم ذلك من قبل المختبر، وأرسلها إلى المختبر في أسرع وقت ممكن.

