

## Instructions de recueil d'urine -ECBU-Nourrissons

### ✓ **Protocol de recueil**

- Se laver les mains au savon.
- Installer le nourrisson comme pour le changement de couche.
- Faire une toilette de la zone urogénitale avec d'eau savonneuse :
  - Pour les filles : toilette vulvaire d'avant en arrière.
  - Pour les garçons : toilette du prépuce et du gland.
- Sécher. Terminer la toilette à l'aide de la lingette désinfectante fournie par le laboratoire.
- Prendre la poche. Détacher et jeter la découpe centrale de la poche. Puis enlever le film protecteur de la zone adhésive en évitant tout contact de vos doigts avec l'intérieur du dispositif.
- Positionner la poche :
  - Pour les garçons : introduire le pénis à l'intérieur de la poche par l'ouverture et bien faire adhérer la partie adhésive sur la peau.
  - Pour les filles, pincer légèrement la poche pour bien la placer.
- Si l'enfant n'a pas uriné au bout de 30minutes, retirer la poche, la jeter, refaire une toilette et mettre en place une poche neuve.
- Dès que l'enfant a uriné, enlever la poche en décollant la partie supérieure en premier. Rabattre la partie adhésive supérieure sur la partie adhésive inférieure pour bien fermer l'orifice.
- Placer la poche contenant les urines soigneusement dans un flacon stérile fourni par le laboratoire.

### ✓ **Conservation et Transport**

2h max à température ambiante.

## تعليمات جمع البول عند الرضع -الفحص الخلوي والبكتريولوجي للبول-

### ✓ طريقة الجمع

- اغسل يديك بالصابون.
- ضع الرضيع في وضعية تغيير الحفاض.
- اغسل منطقة الجهاز البولي التناسلي بالماء والصابون.
- جفف ثم قم بإنهاء التنظيف باستخدام المناديل المبللة المطهرة التي يوفرها المختبر.
- خذ الكيس، ثم قم بإزالة الشريط الواقي من المنطقة اللاصقة، وتجنب لمس الكيس من الداخل.
- قم بوضع الكيس:
  - بالنسبة للذكور: أدخل القضيب داخل الجيب من خلال الفتحة والصق الجزء اللاصق بالجلد.
  - بالنسبة للفتيات : اقرص الجيب برفق لوضعه بشكل صحيح.
- إذا لم يتبول الطفل بعد 30 دقيقة، أزل الكيس وتخلص منه. قم بالتنظيف مرة أخرى وضع كيس جديد.
- بمجرد أن يتبول الطفل، قم بإزالة الكيس من الجزء العلوي أولاً ثم قم بطي الجزء اللاصق العلوي فوق الجزء اللاصق السفلي لإغلاق الفتحة بشكل صحيح.
- ضع الكيس الذي يحتوي على البول بعناية في قنينة معقمة مقدمة من المختبر.

### ✓ الصيانة والنقل

ساعتان كحد أقصى في درجة حرارة الغرفة.